

Palliativmedizin in der ambulanten Versorgung

Augsburg 7.6.2008

Teil 3

Eberhard Klaschik

Lehr- und Forschungsstelle Zentrum für Palliativmedizin
Universität Bonn



Ausgangslage

Palliativpatienten haben häufig den Wunsch zu Hause zu sterben



Welche Faktoren haben einen Einfluss auf den Sterbeort?

Forschungsprojekt – Ambulanter Palliativdienst Bonn/Rhein-Sieg

Ambulante palliative Betreuung in Bonn
– Einflussfaktoren auf eine stationäre Einweisung am Lebensende

M. Kern, E. Ostgathe, H. Wessel

Datenerhebung

Datenquelle:
Standarddokumentation

Untersuchungszeitraum:
2002 - 2006

Untersuchungsgruppe:
verstorbene Patienten des APD – Bonn
n=567

Ergebnisse Geschlecht / Alter

Geschlecht

Männlich: 52,4%

Weiblich: 47,6%


Alter

Durchschnittsalter: 68,2 Jahre
(Min. 30 Jahre; Max 96 Jahre)


Median: 69 Jahre

n=567

Ergebnisse Kontaktaufnahme mit dem APD



Ergebnisse Gründe für den Erstkontakt




Ergebnisse Verteilung der Diagnosen


Diagnose	Anteil	Diagnose	Anteil
Bronchialkarzinom	16,9 %	Nierenzellkarzinom	3,4 %
Kolorectales Karzinom	12,2 %	Doppelkarzinom	1,9 %
Mammakarzinom	9 %	unbekannter Primärtumor	1,4 %
Pankreaskarzinom	8,5 %	Kein Tumor	1,8 %
Prostatakarzinom	8,3 %	Sonstige Tumore	28,4 %
Hirntumor	4,1 %	Keine Angabe	0,4 %
Magenkarzinom	3,9 %		

n=567

Ergebnisse Betreuungszeiten



Ergebnisse Sterbeorte



■ zu Hause verstorben ■ nicht zu Hause verstorben


n=567

Ergebnisse Sterbeorte der Patienten, die nicht zu Hause verstarben

Sterbeort	Anteil
Palliativstation Malteser Krankenhaus Bonn/Rhein-Sieg	55,1%
Allgemein stationär im Krankenhaus	33,2%
Heim	10,2%
Sonstiger Sterbeort	1,5%
Gesamt	100%


n=205

Ergebnisse Analyse: Sterbeort - Einflussfaktoren




n=567

Ergebnisse Analyse: Sterbeort - Einflussfaktoren



n=567


Ergebnisse Sterbeort - Geschlecht



p=0,046

n=567

Ergebnisse Sterbeort - Betreuungszeit




p=0,001

n=567

Ergebnisse Sterbeort - Versorgungssituation

Angehörige im Betreuungsnetz




p<0,001

n=567


Ergebnisse Sterbeort - Versorgungssituation

Angehörige im Betreuungsnetz



p<0,001


Ambulante Pflegedienste im Betreuungsnetz



p<0,001

n=567

Ergebnisse Sterbeort - Symptome (neun häufigsten Symptome am Lebensende)



■ zu Hause verstorben ■ nicht zu Hause verstorben
Mehrfachnennungen waren möglich

n=567


Ergebnis Alter - Sterbeort

Altersgruppen (Median 69 Jahre)	nicht zu Hause verstorben (NH) n=205	zu Hause verstorben (H) n=362
< 69 Jahre	50,7%	46,4%
≥ 69 Jahre	49,3%	53,3%
keine Angaben	-	0,3%
Gesamt	100%	100%

nicht signifikant

n=567

Ergebnis Diagnose - Sterbeort



Blick in die Zukunft

- Brauchen Angehörige ein anderes bzw. verbessertes Unterstützungsangebot?
- (Wie) können Überlastungssituationen der Angehörigen gemindert werden?
- Wie kann eine Verbesserung der Symptomkontrolle gewährleistet werden?



Danke an das Team !
